

ANALISI RETROSPETTIVA SULL'USO DEI FARMACI CHE AGISCONO SUL SNC DURANTE L'EPIDEMIA DA COVID-19.

1Maria Alessandra Puteo, 1Claudio Puteo.

1Farmacia Puteo Dott. Sante SAS

INTRODUZIONE:

La pandemia da Covid 19 ha portato la società ad affrontare non solo una patologia debilitante fisicamente ma anche la sociofobia che, associata alla condizione precaria socio-economica, ha portato ad un nuovo stato di stress potenzialmente dannoso per la psiche. Obiettivo di questo lavoro è dimostrare l'incremento dell'utilizzo di antidepressivi, ansiolitici ed antipsicotici durante la pandemia.

MATERIALI/METODI: Sono stati messi a confronto i consumi dei primi nove mesi del 2019, del 2020 e del 2021; i dati sono stati rilevati in una farmacia pugliese con fatturato SSN > di 300.000 euro. Sono state analizzate e comparate tramite il gestionale in uso, l'utilizzazione dei seguenti farmaci nei diversi dosaggi: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina SSRI (Sertralina, Venlafaxina), il pregabalin indicato per il disturbo d'ansia generalizzato, le benzodiazepine (Alprazolam e Lormetazepam) Inoltre sono stati analizzati i dati relativi a neurolettici atipici quali: olanzapina e quietapina.

Grafico 1




Tabella 1

	2019	2020	2021
Antipsicotici	110	116	103
Antidepressivi	79	115	65

RISULTATI: I risultati ottenuti hanno evidenziato un lieve aumento del 5,5% del consumo degli antipsicotici nel 2020 (116 confezioni) rispetto al 2019 (110 confezioni). I dati del 2021 registrano un calo del consumo delle stesse del -6,4% (103 confezioni) rispetto al 2019 e del -11,2% rispetto al 2020. Per quanto riguarda gli antidepressivi si è riscontrato un notevole incremento del loro utilizzo nel 2020, registrando un aumento dei consumi del 45,6% (115 confezioni) rispetto al 2019 (79 confezioni). Nel 2021 si segnala una netta diminuzione dell'impiego, confrontando i consumi con il 2019 si palesa un calo del -17,7% ed una riduzione del -43,5% rispetto al dato 2020. Le benzodiazepine registrano un incremento dell'utilizzo nei primi nove mesi del 2020 rispetto al corrispettivo dato del 2019: alprazolam +17,1% e lormetazepam +10%. Confrontando il dato 2020 con il 2021 in tutti i casi si è verificato un decremento dei consumi rispettivamente del -17,9%, -19%.

L'analisi dei dati ha mostrato come l'influenza del primo trimestre Marzo-Maggio 2020 abbia riverberato in modo consistente sul consumo dei farmaci antidepressivi, ansiolitici ed antipsicotici, concentrando il consumo per 37,33% del totale del periodo esaminato.

CONCLUSIONI: I risultati ottenuti evidenziano come sia stato difficile per l'Italia affrontare l'emergenza pandemica con un dato nazionale che registra un aumento del +12% del consumo degli ansiolitici. La diminuzione dei consumi già nel 2021 lascia presagire che la percezione nei confronti del virus si sia modificata in funzione della necessità di dover convivere con esso.

