Una iniziativa di:
federfarma · Fondazione Francesco Cannavò · UTIFAR Unione Tecnica Italiana Farmacisti
Con il patrocinio di: Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Partner: edra

COVID-19: RUOLO DEL FARMACISTA NELLA *GOVERNANCE* DI SISTEMA

C. Cannas, E.Livoti, M.S.Rivetti, F.Canepa, E.Cantagalli, V.Naccarato, S.Vigna, B.Rebesco –
Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) - Genova

INTRODUZIONE

Il 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, in ambito nazionale, lo stato di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'infezione causata dal virus SARS-CoV2. A partire da questa sono stati diversi i provvedimenti normativi intrapresi per limitare il diffondersi del COVID-19. Nella nostra Regione, recependo le disposizioni emanate dalle autorità nazionali, sono state messe in atto specifiche misure con l'obiettivo di fornire alle strutture ed Enti Ospedalieri indirizzi operativi e modalità di gestione dell'emergenza volti ad assicurare l'accesso uniforme, capillare e tempestivo alle cure per i pazienti affetti da COVID-19.

MATERIALI E METODI

Attraverso una governance centrale sono stati istituiti degli specifici gruppi di lavoro multidisciplinari: uno denominato "Gruppo di Coordinamento della Terapia Farmacologica (GOFT)" composto da infettivologi, medici di medicina generale, Farmacisti oltreché dai Direttori Sanitari, Socio Sanitari e dai Responsabili delle strutture regionali coinvolte. Un altro gruppo costituito invece da soli Farmacisti, pubblici e privati ed un ultimo composto da informatici e farmacisti.

Sono state organizzate diverse riunioni che, hanno portato, grazie alla fattiva collaborazione degli operatori coinvolti, alla redazione degli indirizzi regionali, anche attraverso documenti tecnici esemplificati delle modalità operative ad hoc, necessari per fornire un supporto nella gestione dell'emergenza.

RISULTATI

Il GOFT ha redatto due raccomandazioni, che sono state periodicamente aggiornate sulla base delle continue revisioni delle schede dei medicinali rese disponibili da AIFA, volte a fornire, le indicazioni per la corretta gestione della terapia domiciliare a base di idrossiclorochina (HCQ) la prima, e la seconda le indicazioni per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta infezione COVID-19.

Il secondo gruppo, consiederate la limitata disponibilità di HCQ e dato che le unità posologiche necessarie al trattamento dell'infezione per singolo paziente era pari a 16 compresse, ha stabilito di provvedere alla singolarizzazione delle stesse evitando sprechi e consentendo l'accesso alle cure ad un più ampio numero di pazienti. Tali confezioni sono state distribuite attraverso la DPC senza corresponsione dell'aggio.

Il terzo gruppo ci ha visto coinvolti in prima battuta nella predisposizione degli elenchi dei medicinali che, sulla base delle disposizioni regionali, dovevano essere trasmessi centralmente per la dematerializzazione delle prescrizioni e rispondere prontamente all'esigenza di limitare gli spostamenti degli assistiti.

RACCOMANDAZIONE n. 1

INDICAZIONI per la PRESCRIZIONE dei FARMACI A BASE DI FARMACI IDROSSICLOROCHINA AD USO DOMICILIARE

RACCOMANDAZIONE n.2

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DOMICILIARE DI PAZIENTI CON SOSPETTA INFEZIONE COVID-19



aic	prodotto	atc	descrizione	gruppo	des_gruppo	categoria	REGIONE	tipo	data_ini
LMR				LMR	OCTOCOG ALFA I GENERAZIONE 500UI 1 UNITA' USO PARENTERALE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
028687022	RECOMBINATE*500UI/10ML FL+I	B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULA	LMR	OCTOCOG ALFA I GENERAZIONE 500UI 1 UNITA' USO PARENTERALE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
LMA				LMA	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 1.000UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
034955068	KOGENATE BAYER*1000UI FL+S	B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULA	LMA	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 1.000UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2017-02-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2017-02-2
					DUI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					DUI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					DUI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2017-02-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
					00UI 5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2017-02-2
LML				LML	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 500UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
034955056	KOGENATE BAYER*500UI 1FL+S	B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULA	LML	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 500UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
034956021	HELIXATE NEXGEN*IV FL500UI+	B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULA	LML	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 500UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2
044726040	KOVALTRY*500UI 1FL+1SIR.+SE	B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULA	LML	OCTOCOG ALFA II GENERAZIONE 500UI 2,5ML 1 UNITA' USO PARENTERA	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2017-02-2
LMD				LMD	OCTOCOG ALFA III GENERAZIONE 1.000UI 1 UNITA' USO PARENTERALE	D-DISTRIBUZIONE DIRETTA	070	F	2016-10-2

Foglio1

CONCLUSIONI

Ancora una volta il farmacista, grazie alle competenze trasversali, si è dimostrato essere un professionista indispensabile per la governance di sistema, conciliando gli aspetti clinici a quelli gestionali-amministrativi ha consentito di rispondere in maniera uniforme e tempestiva alle diverse esigenze.

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria