


# FARMACEUTICA TERRITORIALE: ANALISI SUL CONSUMO DEI FARMACI ANALGESICI OPIOIDI (N02A) IN UNA ASSL DELLA SARDEGNA



M. Muzzoni<sup>1</sup>, A.M.F. Becciu<sup>2</sup>

1.Università degli studi di Sassari- Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

2.Servizio Farmaceutico Territoriale Sassari



## INTRODUZIONE

Gli oppioidi sono dei farmaci analgesici derivati dall'oppio, strutturalmente simili alla morfina e con una farmacodinamica simile alla morfina. Gli oppioidi sono farmaci molto utilizzati in ambito clinico, soprattutto per il trattamento del dolore. Essi, se assunti per breve periodo e sotto stretto controllo medico, sono generalmente sicuri. Tuttavia, gli oppioidi possono causare dipendenza ed essere usati in modo improprio (es. prendendo il medicinale in dosi diverse da quelle prescritte). Nel 2014 il Ministero della Salute ha lanciato un primo allarme, rafforzato dai dati dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), secondo cui il consumo analgesici oppioidi nel nostro Paese era in costante aumento.

## OBIETTIVI

Lo scopo del lavoro è monitorare il consumo e l'utilizzo dei farmaci analgesici oppioidi (N02A) nella nostra area, in modo da verificare se nel corso del tempo vi è stato un incremento del loro utilizzo e se questo può far presupporre un loro abuso.

## MATERIALI E METODI

I dati derivano dal portale per il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata. La coorte analizzata è costituita dai pazienti che hanno assunto analgesici oppioidi (N02A) nel periodo compreso tra 01/01/2017 e il 31/12/2018.

## RISULTATI

Nel 2017 vi erano 11.464 pazienti utilizzatori di analgesici oppioidi, di cui l'età media era di 70,4 anni ( $\pm 14,4$ ), di questi il 63,9% era costituito da donne. Sono state erogate 84.103 confezioni, di cui il 30,5% aventi come principio attivo Ossicodone/Naloxone, il 21,6% paracetamolo/codeina e il 14% fentanil. Nel 2018 vi erano 12.035 pazienti utilizzatori di analgesici oppioidi (+5% rispetto al 2017), di cui l'età media era di 70,2 anni ( $\pm 15,3$ ), di questi il 64,6% donne. Sono state erogate 94.929 confezioni (+12,9% rispetto al 2017), di cui il 29% aventi come principio attivo Ossicodone/Naloxone, il 19% Paracetamolo/Codeina e il 16,5% Fentanil.

## CONCLUSIONI

I dati raccolti descrivono macroscopicamente l'utilizzo dei farmaci analgesici oppioidi nella nostra ASSL, mostrando nel corso di un anno un aumento del numero dei pazienti e delle confezioni di medicinali erogate. Nonostante ciò, l'aumento, essendo contenuto non lascia presupporre un abuso dei medicinali. È necessario stratificare per età gli utilizzatori degli analgesici in modo da verificare se tra le fasce più giovani (15-25 anni) vi è stato un incremento del loro utilizzo e se questo è improprio.